

КОКЛЮШ

(для медицинских работников)

КОКЛЮШ — это опасное инфекционное заболевание дыхательных путей, которое вызывается бактериями. Коклюш является причиной хронического кашля у взрослых.



ИСТОЧНИКОМ ИНФЕКЦИИ являются больные (дети и взрослые) типичными и атипичными формами коклюша. Подростки и взрослые являются основным источником вспышек заболевания и главным источником заражения в семьях детей первых месяцев жизни.

ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ – воздушно-капельный. Обильное выделение возбудителя происходит при кашле.

ГРУППЫ РИСКА

Восприимчивость к коклюшу сохраняется высокой у детей до 1 года, у лиц, не привитых против коклюша, а также у лиц, утративших иммунитет к инфекции с возрастом.

ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД колеблется от 7 до 21 дня.



ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ КОКЛЮША

нарастающий сухой кашель до 2-х недель, затем кашель приобретает приступообразный характер, усиливающийся в ночное время. Часто в конце приступа отмечается рвота.

КОКЛЮШ ОПАСЕН СВОИМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ. Он может приводить к пневмонии, судорогам, нарушениям функции лёгких.



Осложненные формы коклюша, а также летальные исходы характерны для детей первых месяцев жизни (менее 2 мес.). Особенно тяжело протекает коклюш у детей с нарушениями иммунной системы.

Коклюш у беременных может спровоцировать выкидыш и рождение мертвого ребенка.

Единый консультационный центр Роспотребнадзора
8 800 555 49 43



«Недостаточная настороженность» в отношении коклюша у врачей «взрослой» сети, приводит к тому, что диагноз часто устанавливается на поздних сроках заболевания.

МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ ВАЖНО ПОМНИТЬ!

- ❖ **Направлять** на лабораторное обследование всех больных, кашляющих более 7 дней.
- ❖ **Изолировать** всех больных коклюшем, выявленных в детских больницах, родильных домах, домах ребенка, образовательных и в других социальных организациях на срок 25 дней от начала заболевания.
- ❖ **Отстранять** общавшихся с больным коклюшем **детей** в возрасте до 14 лет при наличии кашля, от посещения образовательных организаций и осуществлять ежедневное наблюдение за ними в течение 14 дней с момента прекращения общения.
- ❖ **Отстранять** от работы **взрослых**, общавшиеся с больным коклюшем по месту жительства/работы и наличием у них кашля.
- ❖ **Допускать** **детей и взрослых** в коллектив после получения 2 - х отрицательных лабораторных результатов.
- ❖ **Установить** медицинское наблюдение на 21 день в образовательных организациях и других учреждениях социальной сферы при появлении вторичных случаев заболевания с момента изоляции последнего заболевшего.



ПРОФИЛАКТИКА КОКЛЮША



Единственная надежная профилактика коклюша – ВАКЦИНАЦИЯ!

Вакцинация проводится **3-х**кратно в возрасте до **1 года** (**3; 4,5 и 6 месяцев**) и **одно-**кратно в возрасте **18** месяцев.

ПРОФИЛАКТИКА КОКЛЮША



Соблюдать режим проветривания и влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств в очаге инфекции.

Исключать контакт младенцев с любыми «кашляющими» больными.